

Este espacio está destinado a la presentación de un caso clínico a través de una imagen fotográfica o procedente de cualquier exploración complementaria. Se trata de un ejercicio deductivo en el que, partiendo de la imagen, se plantean unas cuestiones que el autor resuelve en la siguiente página.



Caso clínico

Sección coordinada por
Silvia Alarcón, Mútua de Terrassa


Kazem Mousavi
Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona

Paciente 34 años de edad que consulta por pérdida de agudeza visual en ambos ojos de 2-3 semanas de evolución.

Agudeza visual: 0.6/0.5. Exploración del polo anterior dentro de la normalidad. Presión intraocular 15 mmHg en ambos ojos. Las imágenes siguientes corresponden al fondo del ojo.

¿Cuál sería la sospecha diagnóstica?

1. Retinopatía diabética
2. Retinopatía hipertensiva
3. Vasculitis retiniana bilateral
4. Papilitis bilateral
5. Neuroretinitis bilateral



Respuesta

La respuesta es:
2.

Se sospechó una retinopatía hipertensiva tras observar en el fondo del ojo edema de papila bilateral, exudados algodonosos, hemorragia retiniana en llama, edema macular y cruces arteriovenosos muy patológicos. La tensión arterial en el momento del diagnóstico era 240/140 mmHg. La HTA fue causada por el consumo de cocaína. Se instauró tratamiento antihipertensivo. El paciente recuperó completamente la visión al cabo tres meses.